

ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ НА РИФАБУТИН ПО МАТЕРИАЛАМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-  
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ  
ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ БОЛЬНИЦЫ ГОРОДА ИЖЕВСКА

Мальцева И.И.<sup>1</sup>, Родионова А.А.<sup>1</sup>, Моисеева О.В.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> - БУЗ УР «Республиканская клиническая туберкулёзная больница» МЗ УР, <sup>2</sup> - ГБОУ ВПО  
«Ижевская государственная медицинская академия» Минздрава России, г.Ижевск

COLLATERAL REACTIONS TO RIFABUTIN ON MATERIALS OF DIFFERENTIAL AND  
DIAGNOSTIC OFFICE OF THE REPUBLICAN CLINICAL TUBERCULOSIS HOSPITAL OF  
IZHEVSK

Maltseva I.I.<sup>1</sup>, Rodionova A.A.<sup>1</sup>, Moiseyeva O.V.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> - Republican clinical tuberculosis hospital, <sup>2</sup> - Izhevsk State Medical Academy Ministry of Health  
Russian Federation, Izhevsk

Ключевые слова: туберкулез, побочные реакции, рифабутин

Keywords: tuberculosis, collateral reactions, rifabutin

Целью данного исследования стало изучение частоты неблагоприятных побочных реакций у больных туберкулёзом органов дыхания, принимавших рифабутин. Изучение частоты неблагоприятных побочных реакций у больных туберкулёзом органов дыхания, принимавших рифабутин, проводилось в IV отделении БУЗ УР «Республиканская клиническая туберкулёзная больница» МЗ УР за 2012 год. Всего изучено 140 историй болезни. Все больные в процессе исследования разделены на 3 группы: первая группа – 23 человека, которые не принимали рифабутин, вторая группа – 31 человек, которые приняли весь курс химиотерапии, включая рифабутин, третья группа – 86 человек, которые по различным причинам прервали приём противотуберкулёзных препаратов, в частности из-за побочных действий рифабутина. У 61,4% пациентов, по различным причинам был прерван курс химиотерапии. Распределение пациентов, включённых в исследование, проводилось по половому и возрастному принципу и в 39,5% случаев приём противотуберкулёзных препаратов прервали мужчины в возрасте от 18 до 39 лет. На втором месте (22,1%) находятся мужчины от 40 до 59 лет. Женщины в возрасте от 18 до 39 лет составили 17,4%. Женщины от 40 до 59 лет 9,3%, мужчины от 60 лет и старше (7%), женщины от 60 лет и старше (4,7%). В процессе исследования определены группы причин, по которым курс химиотерапии, был прерван: первая группа: досрочная выписка из стационара по различным причинам. В группу вошло 10 человек, вторая группа: замена препарата, связанная с устойчивостью микобактерий туберкулёза, третья группа: аллергическая реакция на рифабутин в виде гриппоподобного синдрома (данная аллергическая реакция имела место у 58,1% больных), четвертая группа: аллергическая реакция на рифабутин с проявлениями на коже (реакция наблюдалась у 11 человек – 12,8%). Таким образом, развитие неблагоприятных побочных реакций, связанных непосредственно с приёмом рифабутина, зарегистрировано в 70,9% случаев.

Моисеева Ольга Валерьевна: моб.тел. 89128549807, e-mail: ovm@e-izhevsk.ru