

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫХ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ*Моисеева О.В., Михайлова О.Л.*

ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия», г. Ижевск

Ключевые слова: медико-социальная характеристика, впервые выявленный больной, туберкулез, Удмуртская Республика

THE MEDICAL AND SOCIAL PERFORMANCE FOR THE FIRST TIME of REVEALED PATIENTS BY A TUBERCULOSIS IN THE UDMURT REPUBLIC*Moiseeva O.V., Mihaylova O.L.*

The Izhevsk state medical academy, Izhevsk

Key words: the medical and social performance for the first time revealed patient, tuberculosis, Udmurt Republic

Целью исследования явилось: изучение медико-социального портрета впервые выявленных больных туберкулезом Удмуртской Республики (УР).

Для достижения поставленной цели изучена медицинская документация 50 впервые выявленных больных туберкулезом, находящихся на стационарном лечении в 3, 7, 6 отделениях БУЗ УР РКТБ МЗ УР в 2013 г. Для оценки эпидемиологических показателей проанализированы материалы официальной статистики и годовых отчетов фтизиатрической службы УР за 5 лет.

Установлено, что показатель заболеваемости активным туберкулезом среди населения УР имеет тенденцию к снижению, при том, что доля больных туберкулезом, у которых заболевание было выявлено при профосмотрах в УР уменьшилась. Охват профилактической ФЛГ населения 15 лет и старше в 2008-2012 гг. в УР имеет тенденцию к росту, но наблюдается снижение показателя выявляемости активного туберкулеза данным методом. Показатели охвата населения и результата обследования на туберкулез бактериоскопическим методом за 2011-2012 гг. в УР имеет тенденцию к росту. За период 2008-2012 гг. отмечается снижение показателя риска первичного инфицирования в УР.

Выявлено, что среди пациентов преобладают лица мужского пола трудоспособного возраста, преимущественно выявляющиеся по обращаемости, имеющие среднее и средне-специальное образование, в подавляющем большинстве не работающие по различным причинам, имеющие семью и вредные привычки. Более половины больных проживают в благоустроенной квартире, однако 23,0% больных имеют неудовлетворительные жилищно-бытовые условия. У четверти больных наблюдалось бактериовыделение, преобладал инфильтративный туберкулез, при этом у пятой части была установлена широкая лекарственная устойчивость и регистрировалась сопутствующая патология различных органов и систем. Больные проходили ФЛГ в большинстве случаев 1 раз в год, при этом каждый десятый человек не проходил ФЛГ более 2 лет. Пятая часть больных ранее пребывала в учреждениях ФСИН. Анализ показал, что 50,0% больных имели постоянный либо периодический контакт с детьми.

Автор, ответственный за переписку:

Моисеева Ольга Валерьевна
426063, Удмуртская Республика,
Ижевск, ул. Воровского, 156-104,
ovm@e-izhevsk.ru