

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ НА ТУБЕРКУЛЕЗ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ*Морозова Т.И., Данилов А.Н.*ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России,
г. Саратов**Ключевые слова:** профилактические осмотры, туберкулез, Саратовская область**PREVENTIVE EXAMINATIONS FOR TUBERCULOSIS IN THE SARATOV REGION***Morozova T.I., Danilov A. N.*

Saratov state medical University named. V.I. Razumovsky, Saratov

Keywords: preventive care, tuberculosis, Saratov region

Традиционно в Российской Федерации профилактические осмотры на туберкулез включают флюорографическое (ФГ) обследование и туберкулинодиагностику.

Цель. Охарактеризовать профилактические осмотры на туберкулез в Саратовской области. **Результаты.** В 2013 году охват профилактическими осмотрами населения области составил 75,9% (РФ 65,8%, ПФО 68,4%), что отличается в позитивную сторону от среднероссийских значений. С помощью ФГ, как метода активной диагностики туберкулеза, выявлены 75,7% от зарегистрированных больных туберкулезом органов дыхания. В Саратовской области к ФГ осмотрам относятся как к массовому методу диагностики различных заболеваний органов грудной клетки. Выявляемость активных форм туберкулеза на 1000 человек составила 0,6, неспецифических болезней легких (в том числе ХОБЛ) - 1,78, злокачественных опухолей - 0,3. Из группы «здорового населения», которое обследуется 1 раз в 2 года, туберкулез по встречаемости стоит на 2 месте, уступая ХОБЛ (0,4 случая на 1000 человек). В группе «ежегодно обследованных ФГ» выявляемость туберкулеза составляет 1,7 на 1 тыс. человек. В контингентах, подлежащих двукратному осмотру - 1,2 случаев на 1 тыс. Подростки с 15 до 17 лет проходят ФГ- осмотры ежегодно. Охват подростков в 2013 году составил 99,8%, в 2012 году 99,2%, в 2011 г. - 99,0%. Патология в легких выявлена в 2013 году 3,2% лиц (2012 г. - 3,3%). Из них выявляемость туберкулеза в 2013 г. составляет 0,23 на 1 тыс. обследованных, в 2012 г. - 0,3 на 1 тыс. человек. Туберкулиновые пробы поставлены у 98,6% детей от 0 до 17-ти летнего возраста (2012 г. - 98,0%). Двукратной туберкулинодиагностикой охвачено 95,2% детей из групп медико-социального риска (2012 г. - 93,6%).

Выводы. В Саратовской области приоритетным направлением оказания противотуберкулезной помощи населению является профилактическое, направленное на активное раннее и своевременное выявление специфического процесса.

Автор, ответственный за переписку:

Морозова Татьяна Ивановна,
зав. кафедрой фтизиатрии ФПК и ППС,
доктор медицинских наук, профессор
тел: (8452) 26 16 90
e-mail: dispans@san.ru