

ВЛИЯНИЕ СОЧЕТАННЫХ И СОПУТСТВУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА КЛИНИКУ И ЛЕЧЕНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗА МОЧЕВЫХ ОРГАНОВ

Вербецкий А.Ф., Новиков Б.И., Черняев И.А.

ФГУ «УНИИФ» Минздравсоцразвития России, Екатеринбург

Ключевые слова: туберкулез мочевых органов, сопутствующая и сочетанная патология.

INFLUENCE OF ASSOCIATED AND CONCOMITANT DISEASES ON CLINICAL PRESENTATIONS AND TREATMENT OF TUBERCULOSIS OF URINARY ORGANS

Verbetsky A.F., Novikov B.I., Chernyaev I.A.

Ural Research Institute for Phthiziopulmonology, Yekaterinburg

Keywords: urogenital tuberculosis, associated and concomitant diseases

На основании литературных данных и результатов собственных исследований установлено сочетание туберкулеза мочевых органов с различной сопутствующей и сочетанной патологией наблюдается у большинства больных.

Цель: оценить влияние сопутствующей патологии на тактику лечения больных с туберкулёзом мочевых органов.

Проведен анализ частоты сопутствующей и сочетанной патологии в клинике туберкулеза мочевых органов (ТМО) среди 553 впервые выявленных больных указанной локализации. Среди изученных больных ТМО основную часть составили лица старше 50 лет – 58,0%. Мужчин было 48,9%, женщин - 51,1%. Сочетанные локализации туберкулеза были диагностированы в 14,1% случаев: в 12,3% выявлено сочетание ТМО с туберкулезом органов дыхания, в 1,8.% - с другими внелегочными локализациями (туберкулезом периферических лимфоузлов, костей и суставов, женских гениталий).

У 67% больных с ТМО (n=371) установлены: гипертоническая болезнь – у 66 (17,8%), сердечно - сосудистые заболевания – у 49 (13,2%), болезни желудочно-кишечного тракта – у 85 (22,9%), хронический гепатит – у 64 (17,3%), хронический пиелонефрит – у 57 (15,4%), сахарный диабет – у 28 (7,5%), хронический алкоголизм – у 22 (5,9%). У 22 (5,9%) больных было сочетание ТМО и мочекаменной болезни. У 182 (33%) не выявлено сопутствующих заболеваний. На фоне проведения химиотерапии, установлены осложнения, вызванные противотуберкулезными препаратами: аллергические проявления составили 20,7%, токсические – 40,9%, смешанные - 38,4%. Аллергические реакции проявлялись в первые 10 дней, токсические проявления — значительно позднее.

Применение стандартных режимов химиотерапии у больных ТМО с сопутствующей патологией требует коррекции (привлечение врачей-консультантов,

индивидуальный подбор противотуберкулёзных препаратов и применение дополнительных патогенетических методик) в 21,9% случаев в связи с непереносимостью лечения.

Контактные данные:

Новиков Борис Иванович

E-mail: binovikov@mail.ru