

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМБИНИРОВАННЫХ ПРЕПАРАТОВ В СТАЦИОНАРЕ:
ВЗГЛЯД ФТИЗИАТРОВ

Докторова Н.П., Морозова Т.И., Паролина Л.Е.

ГУЗ «Областной клинический противотуберкулезный диспансер», г. Саратов
ГОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России»

Ключевые слова: комбинированные препараты, туберкулез, анкетирование и
интервьюирование

APPLICATION OF FIXED DOSES COMBINATION DRUGS IN HOSPITAL:
MEANING OF PHTHIZIATRISTS

Doctorova N.V., Morozova T.I., Parolina L.E.

Regional Clinical antituberculosis dispensary, Saratov

Saratov state medical university named after V.I. Razumovsky

Keywords: fixed doses combination drugs, tuberculosis, public opinion poll

Для оптимизации терапии разработаны и применяются различные лекарственные формы противотуберкулезных препаратов.

Цель исследования: субъективная оценка применения комбинированных противотуберкулезных препаратов на стационарном этапе лечения.

Материалы и методы. Дизайн исследования – проспективное сплошное. Использовались методы анкетирования и интервьюирования. Опрошено 15 врачей стационара ОКПТД г. Саратова.

Результаты. Все врачи осведомлены о возможностях применения комбинированных химиопрепаратов для лечения туберкулеза и наличии этой лекарственной формы в аптеке учреждения (100%). Большинство специалистов (60%) редко используют эту лекарственную форму в своей клинической практике. Основными причинами являются: более частое возникновение побочных реакций (85,7% врачей диагностировали нежелательные эффекты у своих пациентов); невозможность выделить, на какой компонент лекарственного вещества возникла реакция (50%); сложность при коррекции дозировки (50%); отсутствие оптимальной суточной дозы в таблетке (20%). 85,7% докторов оценивают эффективность комбинированных лекарств по сравнению с применением отдельных химиопрепаратов как наиболее низкую. Только треть врачей отметили психологический комфорт пациентов при лечении малым количеством таблеток. Среди многокомпонентных наибольшее предпочтение отдается двухкомпонентным химиопрепаратам (90%). 70% опрошенных считают целесообразным применение комбинированных химиопрепаратов в фазу продолжения лечения, так как именно эта

лекарственная форма удобна для применения в амбулаторных условиях, обеспечивая контролируемость проводимой химиотерапии (66,6%).

Выводы. Лечащие врачи негативно относятся к назначению пациентам комбинированных препаратов, считая их менее эффективными при лечении туберкулеза на стационарном этапе.

Контактные данные:

Докторова Наталья Петровна

E-mail: drndok@mail.ru