

**ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ
ТУБЕРКУЛЁЗОМ ЛЕГКИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ**

Пунга В.В., Путова Э.В., Якимова М.А., Измайлова Т.В., Капков Л.П., Русакова Л.И.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральный научно-
исследовательский институт туберкулёза» РАМН, Москва

Ключевые слова: эффективность лечения, туберкулез легких, сельская местность

**CHARACTER OF TUBERCULOSIS TREATMENT PROGRESSION AND ITS EFFICIENCY
IN NON-URBAN AREA**

V.V. Punga, E.V. Putova, M.A. Yakimova, T.V. Izmaylova, L.P. Kapkov, L.I. Rusakov
Central research institute for tuberculosis of Russian Academy of Medical Sciences, Moscow

Keywords: treatment efficiency, pulmonary tuberculosis, non-urban area

Цель исследования: изучить особенности течения и эффективность лечения больных туберкулёзом легких в сельской местности и особенности организации противотуберкулёзной помощи в сельской местности. Большинство больных сельской местности выявляются при обращении, при этом, продолжительность сроков с момента появления симптомов до обращения к врачу в 21% случаев составила от 3-х месяцев до года. С момента обращения к врачу сроки установления диагноза в лечебном учреждении в условиях сельской местности значительно затягиваются, в 8% случаев составляют от 3 месяцев до года. Микробиологическая диагностика на уровне КДЛ в сельской местности практически не организована, что является чрезвычайно важным фактором, отрицательно влияющим на своевременность диагностики туберкулёза. В сельской местности, в КДЛ методом Циля – Нильсена бактериовыделение установлено в 9,5% случаев, при этом в бактериологических лабораториях у этих больных МБТ выявлены микобактерии в 55,1%. Из-за позднего выявления заболевания клинические формы туберкулёза в ряде случаев, в сельской местности – более тяжелые, чем у городских больных. В среднем, в 10% случаев, нарушаются регламентированные приказом МЗ РФ №109 сроки контроля эффективности лечения методом бактериоскопии, что часто связано с отдалённостью территорий от бактериологической лаборатории. Областным противотуберкулёзным диспансерам необходимо решить вопрос о доставке мокроты из районов в бактериологическую лабораторию. Результаты лечения больных в сельской местности достаточно высокие за счёт организованной контролируемой терапии.