

АНАЛИЗ ЛЕТАЛЬНОСТИ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ В 6 СТАЦИОНАРНОМ ОТДЕЛЕНИИ БУЗ УР РКТБ МЗ УР В 2014 ГОДУ

Козлова Т.П., Мусеева О.В.

(г. Ижевск, БУЗ УР «Республиканская клиническая туберкулезная больница»
МЗ УР, ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия» Минздрава
РФ, ovm@e-izhevsk.ru)

В 6 отделении выписано больных туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией в 2012 г. 31 чел. (16,6 %), в 2013 г. – 35 чел. (21,1%), в 2014 г. – 55 чел. (27,6%). Среди впервые выявленных больных туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией выписано в 2012 г. 22 чел. (19,5 %), в 2013 г. – 23 чел. (23,5 %), в 2014 г. – 41 чел. (41 %). Среди контингентов больных туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией выписано в 2012 г. 9 чел. (12,2 %), в 2013 г. – 12 чел. (17,6 %), в 2014 г. – 14 чел. (14 %). Умерло больных туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией в 2012 г. 4 чел. (20 %), в 2013 г. – 8 чел. (28,6 %), в 2014 г. – 20 чел. (47,6 %). Среди них, впервые выявленные больные туберкулезом составили в 2012 г. - 2 чел. (22 %), в 2013 г. – 5 чел. (41,7 %), в 2014 г. – 12 чел. (46 %). Среди контингентов умерло - в 2012 г. - 2 чел. (18,7 %), в 2013 г. – 3 чел. (18,8 %), в 2014 г. – 8 чел. (47 %). Среди умерших, мужчин -25 чел., (78 %), женщин -7 чел. (22 %). Средний возраст больных – пациенты работоспособного возраста: 23 – 29 лет составили 8 чел. (25%), 30-39 лет – 14 чел. (43,8%), 40-49 лет – 5 чел. (15,6%), 50-60 лет – 5 чел. (15,6%).

Умерло от ВИЧ-инфекции с генерализованными проявлениями туберкулеза за 2012 – 2014 гг. 16 чел. (50 %). Умерло от туберкулеза в сочетании с ВИЧ-инфекцией в 2012 - 2013 гг. от казеозной пневмонии - 3 чел. (25%). В 2014 г. – 5 чел., (25%), среди них 4 чел. (80%) от казеозной пневмонии, 1 чел. (20%) – от фиброзно-кавернозного туберкулеза. За 2012 – 2014 гг. 8 чел. (25 %) умерли от других заболеваний, среди них 3 чел. (37,5%) умерли от кровотечения из расширенных вен пищевода, от осложнения в виде цирроза печени в 2012 г. - 1 чел., (25%), в 2014 г. - 2 чел., (10%), в 2014

г. 2 чел. (25%) умерли от хронической печеночно-клеточной недостаточности, также осложнения цирроза печени.

В 2013 г. – 1 пациент умер от коронарной недостаточности, 1 человек от пневмоцистной пневмонии, в 2014 г. у 1 пациента смерть наступила от серозного менингита, полисегментарной пневмонии. У 23 чел. (71,8%) ВИЧ-инфекция была выявлена ранее, у 5 чел. (15,6%) сначала выявлен туберкулез, у 4 чел. (12,5%) заболевания обнаружены одновременно. Таким образом, в 2014 г. среди больных, умерших от туберкулеза, отмечается рост ВИЧ-инфицированных пациентов, и на фоне иммунодефицита в терминальной стадии ВИЧ-инфекции развивается генерализация туберкулезного процесса.