

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ И ВИЧ

Ташпулатова Ф.К., Садыков А.С., Галиуллин Т.И.

Ташкентский Педиатрический медицинский институт, Ташкент, Узбекистан

Цель: изучить некоторые медико-социальные факторы у больных туберкулезом легких (ТЛ) сочетанной с ВИЧ инфекцией.

Материал и методы. Проанализированы факторы медико-социального характера у 403 больных ТЛ+ВИЧ пролеченных в областном противотуберкулезном диспансере Ташкентской области с 2013 по 2016гг.

Результаты: среди больных мужчины составили 71,2%, женщин-28,8%. Преобладали лица в возрасте от 21 до 39 лет (59%) и жители села (73,4%). Большинство (72%) больных не работали. Инвалиды составили 9,2%, пенсионеры - 4,7%. Среди вредных привычек преобладало курение-82%, употребление алкоголя и наркотиков установлено у 59% и 69% соответственно. 52,3% пациентов имели низкие семейные доходы. У 77% больных установлено незаконченное среднее образование. ТЛ выявлен при профилактическом осмотре у 34,7%, при обращаемости у 59% и при обследовании в центрах СПИД у 23% больных. В основном у больных отмечены 3 стадия ВИЧ (22%) и 4 стадия ВИЧ инфекции (40,4%). Первоначальный диагноз ВИЧ был установлен у 61%, одновременно ТЛ+ВИЧ у 13% первоначально ТЛ у 26 % больных. У 69,7% больных были установлены наличие сопутствующих заболеваний. Среди клинических форм туберкулеза преобладали больные с диссеминированным туберкулезом легких (44,5%), инфильтративный туберкулез составил 25%.

Выводы. Больные с ТЛ+ВИЧ это в основном мужчины в возрасте от 21 до 39 лет, не работающие, имеющие вредные привычки, с большой частотой сопутствующей патологии, с преобладанием диссеминированного туберкулеза в легких.

Ответственный за переписку: Ташпулатова Фатима Кудратовна,
+998909437494, e-mail: fatima2263@mail.ru